CATABOLISMO DEGLI ACIDI GRASSI

1

LIPIDI SONO LA PRINCIPALE RISERVA ENERGETICA

In un grammo di grassi è accumulata una quantità di energia libera 6 volte superiore rispetto ad un grammo di glucidi. Più **ridotti e anidri**.

Sono la principale riserva energetica selezionata dalla evoluzione. Se utilizzassimo i glucidi invece dei lipidi come riserva di energia principale, un uomo di 70 Kg peserebbe circa 50 Kg in più a parità di energia disponibile.

Gli uccelli migratori possono spostarsi nelle traversate senza alimentarsi per settimane grazie alle riserve lipidiche. Animali che vanno in letargo.

Nell'uomo in caso di digiuno le **riserve glucidiche** si esauriscono in **24 ore**, mentre le **riserve lipidiche** permettono la **sopravvivenza per settimane** ...

2

LIPOPROTEINE

Trigliceridi, colesterolo e fosfolipidi essendo insolubili nel sangue, sono trasportati all'interno di strutture multimolecolari chiamate **lipoproteine**: sono micelle (strutture sferoidali) costituite all'esterno da lipidi anfipatici e proteine, mentre il core idrofobico è costituito da trigliceridi e colesterolo.

Le proteine esterne (**apolipoproteine**) vengono riconosciute dai recettori cellulari di superficie e permettono la captazione delle lipoproteine.

I **chilomicroni** sono le lipoproteine + grandi e trasportano trigliceridi e colesterolo di origine alimentare dall'intestino ai miociti e adipociti.

Dopo aver raggiunto le cellule, i triacilgliceroli dei chilomicroni vengono scissi in acidi grassi e monoacilgliceroli grazie all'enzima **lipasi** localizzata all'esterno delle cellule.

3

4

5

LIPOPROTEINE DEL PLASMA

VLDL a densità molto bassa, IDL a densità intermedia e LDL a densità bassa sono tutte collegate

VLDL: sintetizzate dal fegato, i trigliceridi sono scissi da lipasi e gli acidi grassi sono assorbiti dalle cellule adipose e miociti. Le VLDL scariche rimangono in circolo e si trasformano prima in IDL e successivamente in LDL cariche di colesterolo

LDL: vengono captate da più cellule, rilasciano colesterolo (cattivo) e metabolizzate nei lisosomi.

HDL, lipoproteine ad alta densità, hanno una funzione opposta alle LDL perché trasportano il colesterolo dalla periferia al fegato. Si formano nel sangue dalle altre lipoproteine, estraggono il colesterolo dalle membrane e lo trasportano al fegato dove viene trasformato in acidi biliari (colesterolo buono).

6

7

8

9

10

Coenzima A e Acetil-CoA

Reactive thiol group

Coenzima A

β -Mercaptoethylamine

Pantoic acid

Adenine

Ribose 3'-phosphate

3'-Phosphoadenosine diphosphate

Acetyl-CoA

È definito acetato attivo (chimicamente) a differenza dell'acido acetico. Il legame tioestere con il CoA (ad alta energia) rende il gruppo metilico più reattivo a causa della maggiore acidità degli H in α .

La stessa attivazione si ha con gli acidi grassi più lunghi i quali senza il legame con il CoA sarebbero chimicamente inerti.

11

Conversione di un acido grasso in un acil-CoA, processo a 2 tappe

Gruppo uscente (PP_i) che successivamente dissocia favorendo la reazione finale.

Figura 17.4 **MECCANISMO D'AZIONE** Conversione di un acido grasso in un acil-CoA. La conversione è catalizzata dalla acil-CoA sintetasi e dalla pirofosfatasi inorganica. L'attivazione dell'acido grasso tramite la formazione dell'acil-CoA avviene in due stadi. La reazione complessiva è fortemente esoergonica

$\Delta G'^{\circ} = -19 \text{ kJ/mol}$

$\Delta G'^{\circ} = -15 \text{ kJ/mol}$ (per il processo a due tappe)

Lo ione carbossilato viene adenilato dall'ATP, per formare un acil-adenilato e il PP_i . Il PP_i viene immediatamente idrolizzato a due molecole di P_i .

Il gruppo tiolico del coenzima A attacca l'acil-adenilato (un'anidride mista), spiazzando l'AMP e formando l'acil-CoA, un tioestere.

12

13

14

15

16

Carnitina

La carnitina è sintetizzata a livello epatico a partire da metionina e lisina (AA Essenziali)

È presente in modo abbondante nelle carni.

L'assunzione di carnitina come integratore per migliorare talune prestazioni sportive ha finora dato risultati contrastanti.

Il trasporto degli acidi grassi a catena lunga nel mitocondrio è lo step limitante della loro ossidazione. Questo si spiega con la necessità di regolare la produzione di ATP dai lipidi

Un alto contenuto di zuccheri inibisce (tramite il malonil-CoA, intermedio della biosintesi degli acidi grassi) la carnitina aciltransferasi I e quindi rallenta l'ossidazione dei grassi.

17

18

19

20

21

Perchè ci sono queste 4 tappe?

Qual è la logica chimica ?

22

23

Perchè avvengono queste 4 tappe?

Dato che il singolo legame C-C che unisce i gruppi metilenici negli acidi grassi è stabile, **le prime tre tappe della β ossidazione servono a ridurre la stabilità del legame C-C** (si forma il β -chetoacil-CoA).

La funzione chetonica presente sul $C\beta$ rende questo atomo un buon elettrofilo, tanto da subire l'attacco nucleofilo da parte del gruppo -SH del CoA, nella reazione catalizzata dalla tiolasi.

L'acidità dell'idrogeno in α e la stabilizzazione per risonanza del carbanione generato dall'allontanamento di questo idrogeno, rendono il gruppo terminale --CH2--CO--S-CoA un buon gruppo uscente, facilitando la rottura del legame α - β .

24

RESA ENERGETICA IN ATP

dall'ossidazione completa di un acido grasso a 16 C (16 CO₂):

8 Acetil CoA.....ATP

7 NADH.....ATP

7 FADH₂..... ATP

ATP_{totali} = ?

25

RESA ENERGETICA IN ATP

dall'ossidazione completa di un acido grasso a 16 C (16 CO₂):

8 Acetil CoA.....ATP

7 NADH.....ATP

7 FADH₂..... ATP

ATP_{totali} = ?

26

27

28

La resa energetica dell'Ossidazione di Acidi Grassi

L'ossidazione degli acidi grassi porta alla produzione di una quantità di ATP molto superiore a quella prodotta dal metabolismo aerobico del glucosio. La quantità di ATP prodotto dipende anche dalla lunghezza della catena di acido grasso.

La produzione di energia avviene con la riossidazione dei coenzimi ridotti prodotti nella B-ossidazione e nel ciclo dell'acido citrico, sottraendo però la spesa energetica per la formazione di acil-CoA.

29

30

31

DESTINI METABOLICI DEL PIRUVATO

Si forma da:

GLUCOSIO (glicolisi, principalmente)

DEAMINAZIONE DELL'ALANINA (ossidazione dell' aminoacido)

Si trasforma in :

ACIDO LATTICO (in mancanza di ossigeno)

ACETIL-COA (in presenza di ossigeno)

ACIDO OSSALACETICO (principale formazione di ac. ossalacetico)

GLUCOSIO (gluconeogenesi)

32

33

34

35

36

Ketone Body Accumulation in Diabetic Ketosis

	Urinary excretion (mg/24 h)	Blood concentration (mg/100 mL)
Normal	≤125	<3
Extreme ketosis (untreated diabetes)	5,000	90

37

38

METABOLISMO NEL CERVELLO

Esempio di utilizzo metabolico dei corpi chetonici

- IL CERVELLO HA BISOGNO DI ATP PER CREARE POTENZIALI ELETTRICI SULLA MEMBRANA DEI NEURONI
- PRINCIPALE FONTE ENERGETICA E' IL GLUCOSIO CHE ARRIVA PREVALENTEMENTE DAL SANGUE (GLICOLISI E CICLO DI KREBS)
- L' IPOGLICEMIA (BASSA CONCENTRAZIONE DI GLUCOSIO NEL SANGUE) ANCHE PER PERIODI BREVI CAUSA DANNI IRREVERSIBILI AL CERVELLO
- DURANTE I DIGIUNI PROLUNGATI o DIABETE VIENE OSSIDATO IL β -IDROSSIBUTIRATO
- VI E' QUINDI UN RISPARMIO DELLE PROTEINE MUSCOLARI CHE RAPPRESENTA L'UNICA FONTE PER LA SINTESI DI GLUCOSIO DURANTE IL DIGIUNO

39

40